

SUR LA SYNONYMIE DE QUELQUES NOMS DE LÉPIDOPTÈRES.

Par P. VIETTE.

Ayant entrepris depuis 1950 la recherche et le rangement des types de Lépidoptères Hétérocères du Muséum national de Paris, il est possible de donner aujourd'hui, par l'étude même des types, seule base sérieuse de la Systématique, quelques nouvelles synonymies. Un tel travail est au moins aussi utile que la description de nouvelles espèces, quand on pense à la quantité des vieilles espèces inconnues, ou insuffisamment décrites, que les faunes, ou catalogues, repréentent inlassablement. Tous les types cités sont au Muséum national.

Fam. COSSIDAE.

*HYPOPTA SAHARAE* (D. Lucas).

*Cossus* (?) *saharae* D. Lucas, *Bull. Soc. entom. France*, p. 197, 1907.

*Eremocossus senegalensis* Le Cerf, *Bull. Muséum nat. Hist. nat.*, 25, p. 27, 1919.

*saharae* D. Luc. Holotype ♂, Tunisie, Kébylie, Zarcine 25-5-1906. (genit. ♂, prép. P. Viette, n° 2577).

*senegalensis* Le Cerf. Holotype ♂, Sénégal, Dakar (Waterlot 1907). (genit. ♂, prép. P. Viette, n° 2574).

Ces deux noms sont d'ailleurs, peut être, synonymes de *Hypopta vaulogeri* Stgr., d'après M. Ch. RUNGS de Rabat (*in litt.*).

*COSSUS ARIES* Püngeler.

*Cossus aries* Püngeler, *Deuts. entom. Zeits., Iris*, 15, p. 145, pl. 6, fig. 22, 1902.

*Cossus tahlai* Dumont, *Livre du Centen. Soc. entom. France*, p. 698, 1932.

*Cossus bongiovannii* Krüger, *Ann. Mus. Libico St. Nat.*, 1, p. 330, pl. 13, fig. 11, pl. 17, fig. 127, 1939.

*tahlai* Dumt. Holotype ♂, Tunisie, Bled Tahl, forêt des Gommiers 2-4-1929.

Fam. PYRALIDIDAE.

*ACTENIA VIDUALIS* Chrétien.

*Actenia vidualis* Chrétien, *Ann. Soc. entom. France*, 79 (1910), p. 521, 1911.

*Bulletin du Muséum*, 2<sup>e</sup> série, t. XXIV, n° 6, 1952.

*Pyralis mariaeludovicae* D. Lucas, *Bull. Soc. entom. France*, 54, p. 96, 1949.

*vidualis* Chrét. Lectotype ♀, Tunisie : Gafsa sur détritrus 20-9-09 (genit. ♀, prép. P. Viette, n° 2584).

*mariaeludovicae* D. Luc. Holotype ♀, Tunisie : Marsa-Plage 10-1946 (genit. ♀, prép. P. Viette, n° 2591).

OROBENA FULGURA Le Cerf.

*Orobena fulgura* Le Cerf, *Bull. Soc. entom. France*, 38, p. 219, 1933.

*Pionea jeannelalis* D. Lucas, *Bull. Soc. entom. France*, 50, p. 80, 1945.

*fulgura* Le Cerf. Lectotype ♂, Maroc, Moyen-Atlas, ich ou Zarf 3100-3200 m.

*jeannelalis* D. Luc. Holotype ♂, Maroc : env. de Meknès 10-1937.

Fam. PHALAENIDAE.

NAGIA SYBA (Guenée).

*Catephia syba* Guenée, *Spec. génér. Lepid.*, 7 (Noct. 3), p. 44, n° 1374, 1852.

*Nagia megaruna* Joannis, *Livre du Centen. Soc. entom. France*, p. 432, pl. 23, fig. 5, 1932.

*syba* Gn. Holotype ♀, Ile de France (Maurice) (Desjardins, 1840) et non Abyssinie (cf. P. Viette *Bull. Soc. Linn. Lyon*, 1954, p. 161).

*megarena* Joan. Holotype ♂, Maurice : Moka (J. Vinson 7-1924) ; allotype ♀, *id.* (J. Vinson, 1922).

PHYTOMETRA ERNESTINANA (Blanchard).

*Nanthilda ernestinana* Blanchard, *Hist. nat. Animaux articulés*, Ins. 3, p. 549, 1840.

*Xanthoptera coccinifascia* Grote, *Trans. Americ. entom. Soc.*, 4, p. 293, 1873.

*ernestinana* Blanch. Holotype ♂, U. S. A., Géorgie, Savannah (genit. ♂, prép. P. Viette, n° 2411).

*Nanthilda ernestinana* Blanch. était complètement tombé dans l'oubli. De plus BLANCHARD avait placé sa description originale dans les Pyrales. Grâce à l'obligeance de MM. J. F. GATES CLARKE et J. G. FRANCLEMONT de l'U. S. National Museum, que je tiens à remercier ici, la synonymie avec l'espèce de GROTE a pu être établie.